

Casus: wanneer prikkels pijn doen

Simone Verbunt

Tandarts gehandicaptenzorg i.o. bij het CBT in het Radboudumc

Trefwoorden

Extreme prikkelovergevoeligheid, angst, pijn en totaalextractie

Achtergrond

Een 18-jarige vrouw met autisme en extreme prikkelovergevoeligheid verwezen door haar psychiater vanwege een ernstig carieuze dentitie ervaart erge pijnklachten en wenst totaal extractie. Echter haar ontwikkelingsleeftijd (sociaal-emotionele ontwikkeling 8-18 maanden) beperkt haar vermogen om de gevolgen van deze keuze te overzien.

Casus

Het betreft een patiënte met autisme en extreme prikkelovergevoeligheid ook in het mondgebied. Door het niet verdragen van de prikkel-dempende medicatie is de goede mondzorg al twee jaar niet meer mogelijk. Door tevens een hoog suikergebruik en het onvermogen van de patiënt om voedingsgewoonten aan te passen heeft dit geleid tot een ernstig verslechterde gebitssituatie. De constante dentale pijnklachten leidden tot automutilatie, psychische ontregeling en andere gezondheidsklachten. Gezien de complexiteit van de casus is multidisciplinair besloten tot extractie in algehele anesthesie ondanks verwachting dat gewenning aan een uitneembare voorziening niet haalbaar zou zijn. Ondanks dat er op eigen verzoek van patiënt uiteindelijk toch een prothese werd vervaardigd bleek ze deze niet te kunnen verdragen. Vanwege haar persoonlijke omstandigheden en haar huidige mentale gesteldheid is een wentraject op dit moment niet haalbaar, waardoor ze voorlopig zonder prothese door het leven gaat

Discussie

Waren er echt geen mogelijkheden om de cariësactiviteit te stoppen? Was totaalextractie wel de beste keuze en hadden we niet beter voor een gefaseerde afbouw kunnen kiezen, ook gezien de verwachting dat ze niet aan een prothese zou wennen? En welke mogelijkheden zijn er nog om ervoor te zorgen dat de patiënte haar prothese beter kan verdragen?